Récurrance

Raisonnement et étude de suites

Blaise PASCAL
1623 - 1662

	A
1	0,1
2	=A1*(2-A1)
3	
4	
5	
6	

	A
1	0,1
2	0,19
3	
4	
5	
6

	A
1	0,1
2	0,19
3	0,3439
4	0,56953279
5	0,81469798
6	0,96566316
7	0,99882098
8	0,99999861

Giuseppe PEANO
1858 - 1932

QUESTIONS FLASH

QUESTION I

Voici trois suites :

- Pour tout entier naturel n , $u_n = n^2 - n$
- $v_0 = 5$ $v_{n+1} = 3v_n - 2$
- $w_0 = 7$ $w_{n+1} = w_n + 3$

Préciser pour quelle(s) suite(s) il est très facile de calculer le terme pour $n = 100$

QUESTION 2

Voici deux fonctions écrites en Python qui permettent de calculer le terme de rang n d'une suite u et d'une suite v .

```
1 def U(n) :  
2     u=10  
3     for i in range (1,n+1):  
4         u=2u-1  
5     return u
```

```
1 def V(n) :  
2     v=0.25**n+1  
3     return v  
4
```

Donner l'expression de chacune de ces suites.

QUESTION 3

Montrer que pour tout entier naturel n ,
l'expression $(5n + 1)^2 + 9$ est un multiple de 5.

QUESTION 4

Voici trois propositions qui dépendent d'un entier naturel n .

- $P_1(n) : \ll u_n < 3 \gg$
- $P_2(n) : \ll v_n = 3n - 1 \gg$
- $P_3(n) : \ll w_n = \frac{n}{n+1} \gg$

Écrire chacune de ces propositions pour l'entier $n + 1$.

CORRECTION

QUESTION I

Voici trois suites :

- Pour tout entier naturel n , $u_n = n^2 - n$
- $v_0 = 5$ $v_{n+1} = 3v_n - 2$
- $w_0 = 7$ $w_{n+1} = w_n + 3$

Préciser pour quelle(s) suite(s) il est très facile de calculer le terme pour $n = 100$

QUESTION 2

Voici deux fonctions écrites en python qui permettent de calculer le terme de rang n d'une suite u et d'une suite v .

```
1 def U(n) :  
2     u=10  
3     for i in range (1,n+1):  
4         u=2u-1  
5     return u
```

```
1 def V(n) :  
2     v=0.25**n+1  
3     return v  
4
```

Donner l'expression de chacune de ces suites.

QUESTION 3

Montrer que pour tout entier naturel n , l'expression $(5n + 1)^2 + 9$ est un multiple de 5.

QUESTION 4

Voici trois propositions qui dépendent d'un entier naturel n .

- $P_1(n) : \ll u_n < 3 \gg$
- $P_2(n) : \ll v_n = 3n - 1 \gg$
- $P_3(n) : \ll w_n = \frac{n}{n+1} \gg$

Écrire chacune de ces propositions pour l'entier $n + 1$.

Raisonnement par récurrence

On va s'intéresser aux propositions dépendant d'un entier naturel n .

Qu'appelle-t-on une proposition en mathématiques ?

Définition

Une proposition est une phrase qui peut être vraie ou fausse.

Raisonnement par récurrence

*Examinons trois exemples de propositions dépendant d'un entier n .
L'objectif est d'étudier si ces propositions sont vraies pour tout entier naturel n .*

$P(n)$: « $n^2 + n + 11$ est un nombre premier »

$Q(n)$: « $(5n + 1)^2 + 9$ est un multiple de 5 »

$R(n)$: « $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ » avec $n \geq 1$

Raisonnement par récurrence

Raisonnement par récurrence

$P(n)$ une proposition dépendant d'un entier naturel n
Les deux étapes du raisonnement par récurrence :

Étape 1 : initialisation

On vérifie que la proposition que l'on souhaite démontrer est vraie pour l'entier n_0 : on vérifie $P(n_0)$

Étape 2 : hérédité

On montre que si la proposition est vraie pour un entier quelconque $k \geq n_0$ alors elle est vraie pour l'entier qui suit, c'est-à-dire l'entier $k + 1$: on montre que

pour tout $k \geq n_0$, $[P(k) \Rightarrow P(k + 1)]$

On aura ainsi montré que la proposition est vraie pour tout entier supérieur ou égal à n_0

Raisonnement par récurrence

Un premier exemple

Démontrons par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

Initialisation

Hérédité

On suppose que la proposition est vraie **pour un entier quelconque $k \geq 1$** :

On veut démontrer qu'elle est vraie pour l'entier $k + 1$:

Conclusion

$P(1)$ est vraie, la proposition est héréditaire, donc $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

Raisonnement par récurrence

Un deuxième exemple

Soit (u_n) la suite définie par : $u_0 = 1$ et pour tout naturel n : $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}$.

On admet que la suite (u_n) est définie et strictement positive.

Démontrer par récurrence que : pour tout entier naturel n , $u_n \leq 3$.

Initialisation

Hérédité

On suppose que la proposition est vraie **pour un entier quelconque $k \geq 0$** :

On veut démontrer qu'elle est vraie pour l'entier $k + 1$:

Conclusion

$P(0)$ est vraie, la proposition est héréditaire, donc $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

Étude de suites définies par une relation de récurrence

$$f(x) = 2x(1-x)$$

$$u_0 = 0,1 \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

$$f(x) = \frac{3}{x+1}$$

$$u_0 = 3 \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

$$f(x) = -\frac{1}{5}(x-5)^2 + 3$$

$$u_0 = 5 \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

Étude de suites définies par une relation de récurrence

Théorème

Si la suite (u_n) est **croissante et majorée** alors (u_n) **converge**.

Si la suite (u_n) est **décroissante et minorée** alors (u_n) **converge**.

Illustration graphique

(u_n) est **majorée par M** signifie que pour tout entier naturel n ,
 $u_n \leq M$

(u_n) est **minorée par m** signifie que pour tout entier naturel n ,
 $u_n \geq m$

Étude de suites définies par une relation de récurrence

Théorème

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et $\ell \in I$. Soit (u_n) une suite à valeurs dans I .

Si (u_n) converge vers ℓ alors $(f(u_n))$ converge vers $f(\ell)$.

Exemple d'application

Pour tout entier naturel $n \geq 1$ on définit les suites (u_n) et (v_n) ainsi :

$$u_n = \frac{1}{n} + 1 \quad v_n = e^{u_n}$$

Calculer la limite de la suite (v_n) .

EXERCICES

EXERCICE I

On considère une suite (u_n) définie pour tout entier naturel n , par :
 $u_0 = 0,1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x(2 - x)$

1. Étudier les variations de f sur $[0 ; 1]$.
2. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n ,
$$0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$$
3. En déduire que la suite (u_n) converge.
4. Calculer sa limite.

CORRECTION I

Variations de f sur $[0 ; 1]$

$$f(x) = x(2 - x)$$

$u_0 = 0,1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$
Montrer par récurrence que
pour tout entier naturel n ,
 $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$

En déduire que la suite (u_n) converge.
Calculer sa limite.

EXERCICE 2

Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $10^n - 1$ est divisible par 9.

CORRECTION 2

P_n : « $10^n - 1$ est divisible par 9 »

EXERCICE 3

Pour tout entier naturel $n \geq 3$, on considère la proposition $P_n : \ll 2^n > n^2 \gg$

1. La propriété P_n est-elle héréditaire pour $n \geq 3$?
2. A-t-on, pour tout entier $n \geq 3$, l'inégalité $2^n > n^2$?